



Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота - контагиозная инфекционная

болезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся персистентной лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки, образованием кожных узлов, поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения.

Источником инфекции являются больные и латентно переболевшие восприимчивые животные.

Возбудитель выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, истечениями из носа, рта и глаз, через пораженные кожные покровы, спермой и молоком.

Пути распространения возбудителя является: механический перенос членистоногими различных видов, через контаминированные возбудителем корма, воду, воздух, объекты окружающей среды, поверхности помещений, оборудования, транспортных и технических средств, через инфицированное молоко и сперму.

Инкубационный период при заразном узелковом дерматите крупного рогатого скота составляет не более 7 дней.

Клинические признаки- отмечается повышение температуры тела до 41°C, на 7-12 сутки в области средней трети шеи, плеч, конечностей, живота, промежности, паха, мошонки, морды, молочной железы, вокруг глаз образуются узелки диаметром 2-5 см, которые в последующие 2 недели могут некротизироваться. На веках появляются эрозии и изъязвления, на глазах - конъюнктивиты и помутнение роговицы. У большинства больных восприимчивых животных из носовой полости выделяется сначала серозно-слизистый экссудат, а затем гнойная слизь со зловонным запахом. При осложнениях вторичной микрофлорой в области подгрудка и путовых суставов развиваются отеки подкожной клетчатки.

В целях предотвращения возникновения и распространения заболевания заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, владельцы животных обязаны выполнять Ветеринарные правила, утвержденные приказом МСХ от 5 апреля 2017 года N 166 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота".

Чтобы предупредить заражение животных необходимо соблюдать ветеринарные правила:

- провести идентификацию всех животных и поставить на учет в ветеринарной службе;
- не приобретать животных без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие местности и здоровье животных;
- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для профилактических осмотров, иммунизаций;
- извещать государственную ветеринарную службу о вновь приобретённых животных;
- всех вновь приобретённых животных содержать изолированно в течение 30 дней с проведением карантинных мероприятий;
- регулярно проводить обработку животных препаратами от кровососущих насекомых.



Для профилактики заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота специалистами госветслужбы проводится иммунизация восприимчивых животных, с использованием вирусвакцины против оспы овец и заразного узелкового дерматита КРС культуральной сухой «ШипПокс-ЛСД вак». Согласно инструкции: при плановой вакцинации для профилактики заразного узелкового дерматита КРС прививают животных с 3-х мес. возраста. Ревакцинацию проводят через 12 месяцев. Иммунитет формируется через 21 день, продолжительностью 12 месяцев.

При обнаружении животных с признаками заболевания немедленно сообщить об этом в ГБУ «Ветуправление Мостовского района»:

- начальник- 8(86192) 5-13-52

- начальник отдела противоэпизоотических мероприятий - 8(86192) 5-29-37.